

Альтеративное (паренхиматозное) воспаление характеризуется наличием повреждения ткани, в основном паренхимы органа. Начинается оно сразу распространенными процессами, начиная от мутного набухания и кончая некротическими изменениями.

В последнем случае говорят о некротическом воспалении. При нем могут наблюдаться фиброзные изменения стромы органов и стенок сосудов, а со стороны паренхиматозных элементов — различные степени [альтерации](#). Некротический тип альтеративного воспаления отмечается при гиперергическом воспалении.

### **Этиология**

альтеративного воспаления разнообразна. Оно возникает при действии на организм различных токсических веществ, вирулентных бактерий, а также развивается в сенсibilизированном организме при действии на ткани разрешающего фактора.

Локализация альтеративного воспаления **различна**. Оно может возникать в паренхиматозных органах, слизистых оболочках, ткани ЦНС, периферических нервах. Паренхиматозные органы при альтеративном воспалении становятся эластичными, тусклыми с поверхности и на разрезе, похожи на вареное мясо. При микроскопическом исследовании обнаруживаются различные

### [дистрофические процессы](#)

(мутное набухание, жировая дистрофия, некроз) и выраженная в той или иной степени сосудисто-мезеихимальная реакция (расширение сосудов, лейкодиapedез, пролиферация оседлых соединительнотканых клеток).

**Исход** альтеративного воспаления зависит от степени поражения и нарушения тканей. Легкие степени его проходят без серьезных осложнений, незначительные зоны некроза заживают рубцами.

**Значение** альтеративного воспаления для организма определяется функцией страдающего органа и глубиной его патологии. Особенно грозное альтеративное воспаление в миокарде и нервной системе.

Прочитать еще:

1) [Течение нефрита](#)

2) [Рак толстого кишечника](#)

3) [Бронхит](#)