

При саркоидозе (**болезнь Бенье — Бека — Шаумана**), заболевании неизвестной этиологии, в лимфатических узлах и, реже, во внутренних органах образуются гранулемы из эпителиоидных и гигантских многоядерных клеток с небольшой примесью лимфоцитов (саркоидные гранулемы).

Признаков некроза в гранулемах обычно не видно и этим они отличаются от туберкулезных узелков, хотя имеют очень сходное с ними строение. Гранулемы обладают склонностью к гиалинозу. Некоторые авторы относят саркоидоз к группе ретикулозов.

Образование в организме гранул, характеризующихся, как было указано выше, клеточными пролиферациями, имеет отношение к иммунологическим процессам в организме. Гранулематоз определенным образом отражает динамику

иммунологического процесса

— от начальных стадий повреждения ткани до его конечных фаз, заканчивающихся рубцеванием гранулемы, что; указывает на высокую степень резистентности организма. Следует также добавить

[лимфогранулематоз](#)

любой этиологии сопровождается появлением, плазматических клеток, участвующих в иммунологических процессах. Что касается лечения саркоидоза, медикаментозная терапия должного эффекта не дает. Помогает только комплексное лечение с применением облучения и радиоактивных препаратов.

Прочитать еще:

- 1) [Опухоли экзокринных желез](#)

- 2) [Злокачественные опухоли щитовидной железы](#)

- 3) [Опухоли сосудистого происхождения](#)