

Следует сказать, что полипы на ряде слизистых покровах чаще имеют воспалительный характер, в то время как в желудке, кишечнике в основе полипов имеется опухолевый рост.

В зонах плоского эпителия, который находится близ призматического, например в анусе, половых органах, секрет слизистых покровов при хроническом воспалении регулярно [раздражает](#)

плоский эпителий. Это способствует разрастанию стромы и паренхимы (эпителия) с образованием сосочковых структур —

остроконечных кондилом

. Подобные сосочковые патологии эпителия имеют место при сифилисе, гонорее и прочих заболеваниях, сопровождающихся хроническим воспалительным процессом, и несколько схожи с папилломой. В отличие от нее строма остроконечных кондилом чрезмерно усеяна лейкоцитами и лимфоцитами.

Свойства протекания продуктивного воспаления в органах обусловлены их структурными особенностями. Так, в сердце продуктивное воспаление бывает узелковым ограниченным, и межуточным диффузным. В печени **межуточное**

воспаление чаще

системное, идя по строме органа. В почках продуктивное воспаление имеется в клубочках и выражается картиной продуктивного гломерулита без изменения стромы органа. В лимфоидных образованиях (миндалины, лимфатические узлы, солидарные фолликулы)

[продуктивное воспаление](#)

выражается пролиферацией лимфоидных зон, эндотелия синусов, ретикулярных клеток, что приводит к увеличению форм органа, и получает названия:

гиперпластический тонзиллит, лимфаденит, фолликулярный энтерит, колит и т. д. В ЦНС пролиферация идет в основном за счет нейроглии и элементов сосудов. В стенках сосудов воспаление выражается пролиферацией эндотелия и адвентициальных клеток.

Течение продуктивного воспаления бывает острым, но в большинстве случаев оно носит затяжной характер.

Прочитать еще:

- 1) [Тканевая и бактериальная эмболия](#)
- 2) [Опасность при инфаркте](#)
- 3) [Изменения в организме при атеросклерозе](#)