

К дисплазиям относится также болезнь Педжета, или деформирующий остоз, характерной особенностью которого является непрерывная перестройка костей скелета (чаще всего костей крыши черепа), совершающаяся вне влияния статических или каких-либо других факторов.

Выражены процессы остеокластической резорбции кости, новообразования кости, замещения костномозгового пространства разрастающимся эндостом. Характерным гистологическим признаком болезни является **мозаичная структура** костных фрагментов. Мозаичность объясняется наличием резко выраженных и широких линий склеивания между

[костными пластинками](#)

. Кости утолщены, но по сильно уплотнены, компактный слой трубчатых костей разрежен (спонгизация). Болезнь встречается в пожилом возрасте.

Этиология

и

патогенез

ее неясны.

К диспластическим болезням костей относятся: несовершенный остеогенез, характеризующийся недостаточным развитием костной ткани и ломкостью костей (встречается у детей младшего возраста); мелореостоз, для которого типичным является избыточное образование костной ткани (гиперостоз) по длиннику кости, сходное с наплывом воска или стеарина на свече; хондродистрофия; обусловленная системным нарушением роста костей хрящевого генеза; мраморная болезнь, или остеопетроз, при которой происходит **утолщение кортикального слоя** за счет разрастания костного вещества со стороны эндоста с беспорядочным нагромождением масс костного вещества; остеом мелодисплазия (миелофиброз, остеосклеротическая лейкемия), характеризующаяся нарастающим склерозом костного мозга, новообразованием остеоидной ткани, неправильным ее обызвествлением, появлением очагов внекостно-мозгового кроветворения с наличием в них большого числа мегакариоцитов, спленомегалией и лейкомоидной реакцией крови.

Прочитать еще:

1) [Вторая стадия брюшного тифа](#)

2) [Колибактериальная инфекция](#)

3) [Нефросклероз](#)