Белый инфаркт с геморрагическим венчиком обычно возникает в почках, миокарде. Он имеет бело-желтую окраску, в почке—треугольную форму, окружен поясом кровоизлияния.

Зона кровоизлияния возникает в результате того, что **рефлекторный спазм** по периферии инфаркта быстро сменяется паралитическим расширением и переполнением кровью капилляров с развитием явлений престаза, стаза инфаркта присоединяются массы эритроцитов, лежащих вне сосудов по периферии инфаркта, и расширенные мелкие сосуды.

Красный (геморрагический) инфаркт обычно встречается в легком. Он треугольной формы, основанием обращен к плевре, на разрезе темно-красного цвета, довольно резко отграничен от окружающей ткани. С течением времени инфаркт бледнеет вследствие гемолиза эритроцитов. Инфаркт гэтого типа возникает в связи с особенностями кровообращения легкого, а именно наличием двух артерий— легочной и бронхиальной, анастомози-рующих друг с другом. В условиях застойного полнокровия и закрытия просвета ветви легочной артерии в область омертвения ткани легкого с большой силой поступает из бронхиальной артерии кровь, которая переполняет и разрывает капилляры и изливается в просвет альвеол. При геморрагическом инфаркте омертвевший участок пропитывается кровью.

Прочитать еще:

1) Иммунологический статус

2) Острый кавернозный туберкулез

3) Изменения в ЦНС при сифилисе