

В селезенке инфаркты также могут нагнаиваться, что осложняется гнойным перитонитом, весьма опасным для жизни. Весьма опасные также и требуют немедленного хирургического вмешательства инфаркты кишечника.

Геморрагическое инфарцирование кишечной стенки **сопровождается** обычно ее гангреной, что ведет к прободению стенки и попаданию содержимого кишечника в брюшную полость с развитием перитонита. Особенно опасны в отношении размягчения так называемые септические инфаркты, возникающие во многих органах и приводящие к появлению множественных очагов нагноения.

Инфаркты в почках не представляют большой опасности для жизни, если они небольшие. Однако при крупных инфарктах, а особенно при симметричных некрозах коры, возникает **острая почечная недостаточность** (анурия, уремия). [Инфаркт сетчатки](#) может привести к ослаблению зрения. Инфаркты мозга имеют различное значение в зависимости от локализации очага размягчения. Чаще всего они возникают в области серых узлов, вызывают разрушение проводящих путей и клинически выражаются появлением параличей. Грозным и практически не заметным является образование **тромбов** после нарушения сократительной способности миокарда. В результате этого закупориваются магистральные артерии, особенно это касается легочного ствола, что приводит к моментальной остановке сердца.

Прочитать еще:

- 1) Смешанные диспротеинозы
- 2) Переход доброкачественной опухоли в злокачественную
- 3) Злокачественные опухоли