Острая коронарная недостаточность возникает при внезапном нарушении коронарного кровообращения, вызванного спазмом сосудов, интрамуральной гематомой в бляшке, разрывом покрышки бляшки, образованием тромба в просвете артерий.

Обычно все эти процессы возникают в спокойном состоянии, но чаще — при некотором физическом или [нервном напряжении](#) больного. В таких случаях коллатеральное кровообращение оказывается недостаточным и возникает острая ишемия миокарда. Клинически при этом наблюдается болевой синдром в области сердца с иррадиацией болей в левую руку. Этот синдром, если он вызван только спазмом измененных **атеросклеротическим процессом** венечных артерий, проходит сам по себе или после применения сосудорасширяющих средств. Он носит название стенокардии, или грудной жабы. Если же спазм усиливается, к нему присоединяется разрушение покрышки бляшки, образование тромба **в магистральном сосуде** или в **коллатералях**. Тогда в зоне ишемии начинают возникать некробиотические и некротические изменения, которые обозначаются как инфаркт миокарда. Острая коронарная недостаточность всегда сопровождается предшествующим заболеванием - ишемической болезни сердца.

Прочитать еще:

1) [Последствия образования камней](#)

2) [Рахит](#)

3) [Причины возникновения анемий](#)