Гипертоническая болезнь, эссенциальная гипертония, болезнь повышенного артериального давления — хроническое страдание, основным клиническим признаком которого является длительное и стойкое повышение (гипертензия) артериального, минимального и максимального, давления.

Нормальное артериальное давление определяется следующими цифрами: минимальное 60 мм ртутного столба, максимальное 110—120 мм. При гипертонической болезни эти **ци фры повышаются:**
минимальное до 100— 120 мм и выше, максимальное до 170—250 мм и выше.

Временное повышение артериального давления наблюдается при некоторых состояниях организма: всякого рода эмоциях, напряженной умственной или физической работе. Более стойкие повышения отмечаются при патологических процессах, например гломерулонефрите, сужении почечной артерии, **хроническом пиелонефрите**, коарктация аорты, опухоли мозгового слоя надпочечников, базофильной аденоме гипофиза, некоторых опухолях мозга, в
климактерическом периоде
у женщин. Такие гипертонии или гипертензионные синдромы представляют вторичные проявления основного заболевания и носят название
симптоматических
. Они могут быть устранены при ликвидации основной болезни, например посредством удаления опухоли, наложения сосудистого анастомоза при сужении почечной артерии и т. д. Поэтому точное распознавание симптоматических синдромом имеет большое клиническое значение. Существуют еще так Называемые региональные гипертонии с
повышением кровяного давления
в какой-либо определенной системе сосудов, например гипертония малого круга, портальная гипертония.

Прочитать еще:

1) Классификация опухолей

2) Морфология тромба

3) Остеоидостеома