В настоящее время принято выделять четыре фазы дезорганизации соединительной ткани при всех коллагеновых болезнях и, в частности, при ревматизме:

1) мукоидное набухание;

2) фибриноидное изменение;

3) гранулематоз;

4) склероз.

Мукоидное набухание представляет самую раннюю фазу дезорганизации соединительной ткани. Выделение и четкое отграничение мукоидного набухания как самой ранней стадии ревматического поражения соединительной ткани имеет большое значение потому, что при ней наблюдается поверхностная дезорганизация соединительной ткани , касающаяся главным образом межуточной субстанции и в очень слабой степени коллагеновых волокон. В связи с этим наблюдается полное восстановление структуры ткани,если под влиянием лечебных мероприятий удается остановить прогрессирование болезни. В других случаях мукоидное набухание заканчивается склерозом.

Фибриноидное изменение является следующей фазой. Вслед за мукоидным набуханием при прогрессировании процесса наступают более глубокие изменения соединительной ткани, которые могут быть обозначены как фибриноидное набухание, или стадия появления фибриноида. В этой фазе происходит глубокая и необратимая дезорганизация соединительной ткани.

Прочитать еще:

1) Нейрогуморальная гипертрофия

2) Аденокарцинома

3) Морфология трубной беременности