В стенках сосудов определяются клеточные инфильтраты, гематоксилиновые тельца. Суставы при системной красной волчанке также вовлекаются в патологический процесс, и клинические проявления полиартрита весьма часто диагностируются в начальной стадии заболевания.

Однако процессы, образующиеся в суставных капсулах, не достигают значительной степени и редко сопровождаются контрактурами (в таких случаях заболевание приобретает некое сходство с **ревматоидным артритом**). Гистологически в синовиальной оболочке видны зоны клеточной инфильтрации, состоящей из [макрофагов](#) и плазматических клеток. Можно также увидеть склерозированные ворсинки. В стенках сосудов происходит воспалительная инфильтрация (васкулиты). В околоуставной ткани имеют место участки мукоидного и фибриноидного набухания и участки склероза.

Селезенка увеличена, вес ее достигает 400 г. Капсула утолщена на разрезе с заметными **прослойками соединительной ткани**. При гистологическом исследовании обнаруживается атрофия фолликулов, замещение лимфоцитов макрофагами и плазматическими клетками. Стенки одних центральных артерий утолщены, склерозированы, других — с явлениями свежего фибриноидного некроза.

Прочитать еще:

1) [Грипп](#)

2) [Биохимия заболевания](#)

3) [Лимбический отдел](#)