

Паренхиму опухоли основывают клетки, которые характеризуют данный вид опухоли. Таким образом, морфологическая характеристика опухоли определяется ее паренхимой.

Большинство опухолей построено по типу органа, т.е. имеет паренхиму и строму. Такие опухоли имеют органоидное строение. В некоторых опухолях, например в саркомах, строма слабо выражена и почти не определяется. Такие опухоли условно называют гистиоидными, так как в них строма образована или системой тонкостенных сосудов, или аргирофильными волокнами.

Строма опухоли растет вместе с паренхимой и возникает из стромы того органа, в котором образуется опухоль. Особенно хорошо строма выражена в некоторых эпителиальных опухолях, которые называют фибро-эпителиальными. Если клетки опухоли по гистологическому строению соответствуют клеткам органа, в котором опухоль развивается, она обозначается как **гомологичная**, или **гомотипическая**. В тех случаях, когда клетки опухоли гистологически отличаются от клеток органа в такой степени, что кажутся как бы чуждыми для него, опухоли называются [гетерологическими](#), или гетеротопическими. Если же опухоли возникают из чуждых данному органу элементов, попавших сюда в порядке эмбриональных смещений (например, опухоль из костной ткани в стенке матки, опухоль из жировой ткани).

Прочитать еще:

1) [Спинномозговая жидкость](#)

2) [Щитовидная железа](#)

3) [Патогенез](#) коллагенозов