

Экспансивный рост опухоли заключается в том, что она произрастает «сама в себе», клетки не выходят за границы опухоли, которая растет постепенно во все стороны и поэтому почти всегда имеет шаровидные или овальные размеры.

Соседние сдавленные ткани становятся более дряблыми и образуют некую капсулу. Опухоли с экспансивным ростом без труда вылушиваются. Инфильтрирующий, или [инвазивный рост](#) характеризуется тем, что клетки врастают за ее черты в подлежащие структуры и уничтожают их.

Инвазия, как правило, идет в направлении наименьшего сопротивления по имеющимся или построенным путям, заполненным тканевой жидкостью, по направлению нервных стволов, кровеносных и лимфатических сосудов, в рыхлую соединительную ткань. Если по маршруту инвазии клеток попадают капсулы органов, мембраны или прочие плотные ткани, то клетки опухоли вначале расходятся по их поверхности.

Эндофитный рост — это рост опухоли (экспансивный или инвазивный) в глубь структуры органа. При этом опухоль, например с поверхности эпителия, фактически невидна, в то время как на разрезе можно сказать, что она занимает большую площадь.

Экзофитный рост противоположен эндофитному, так как опухоль развивается в просвет полости, например матки, мочевого пузыря, бронха, кишки и т. д. Опухоль при экзофитном росте может полностью заполнить ту или иную полость, иногда, будучи спаянной, со стенкой полости маленьким соединением.

Прочитать еще:

- 1) [Опухоли меланинообразующей ткани](#)
- 2) [Патологическая анатомия миокардита](#)
- 3) [Воспалительный процесс при сифилисе](#)