

Как правило, метастатические вторичные узлы появляются быстрее и поэтому они, как правило, крупнее узла первичной опухоли. Так, например, рак желудка может быть размерами с орех, а его метастазы в печени достигают формы кулака и более.

Разумеется, что в клинической картине патологии на первое место выходят симптомы со стороны печени, что и приводит иногда к клиническим погрешностям.

Опухолевые эмболии (по движению крови или лимфы) не всегда приводят к появлению **метастазов**

. Клетки опухоли в просвете артерий, а также в капиллярах органов могут отмирать. Экспериментальные работы утверждают, что клетки злокачественной опухоли, погруженные в вену, остаются живыми в течение 2 дней, а затем [некротизируются](#)

Известно

, что, несмотря на присутствие опухолевых эмболий, метастазы в ряде органах (селезенка, сердце, скелетные мышцы) развиваются крайне редко. Таким образом, появление метастаза нельзя свести только к механическому закупориванию капилляров опухолевыми клетками. В опытах установлено, что некоторые воздействия на нервную систему влияют на характер и интенсивность метастазирования. При обнаружении ранних метастазов тактика лечения опухоли сильно изменяется.

Прочитать еще:

- 1) [Спонтанные переломы](#)
- 2) [Эндокардит](#)
- 3) [Лимфоциты при воспалении](#)