

Тимома — опухоль зобной железы. По внешнему виду опухоль как бы повторяет очертание этого органа, хорошо инкапсулирована, на разрезе имеет сероватую окраску. Встречаются кисты и отложения извести. Иногда ткань опухоли прорастает капсулу и внедряется в соседние органы, а в дальнейшем дает метастазы в лимфатические узлы и другие органы.

Тимома оказывает давление на жизненно важные органы и часто сочетается со своеобразной болезнью, которая называется миастения (ослабление деятельности поперечнополосатых мышц). **Удаление тимомы** может приводить к выздоровлению от миастении. Гистологическая структура опухолей зобной железы до сих пор точно не изучена. Известно, что зобная железа претерпевает сложное развитие и состоит из **нескольких тканей**: эпителиальной, лимфоиднонодобной и межуточной. Из каждого зачатка и могут возникать тимомы, разнообразные по своему строению. Большинство из них носит злокачественный характер. К доброкачественным опухолям относятся кисты, опухоли из

[межуточной ткани](#)

. Однако большая часть тимом — опухоли, состоящие из малодифференцированных клеток, поэтому они должны быть отнесены к злокачественным. По гистологической структуре различают следующие типы тимом.

Тимома лимфоэпителиальная, состоящая из эпителиальных клеток, расположенных тяжами, островками, розетками. Эпителий плоского типа. В большом количестве встречаются гассалевы тельца. Между эпителиальными пластами обнаруживаются скопления тимоцитов. В одних опухолях преобладают эпителиальные клетки, в других — тимоциты. При отсутствии телец Гассалья опухоль напоминает лимфоэпителиальную опухоль, развивающуюся в носоглотке (так называемая опухоль Шминке).

Тимома веретенноклеточная названа так по форме составляющих ее клеток, очень похожих на соединительнотканые, но по происхождению эпителиальных.

Рак зобной железы развивается из эпителиального зачатка зобной железы и имеет характер [плоскоклеточного рака](#). Помимо описанных опухолей, в зобной железе встречаются клеточные разрастания, напоминающие по внешнему виду тимому. Однако при гистологическом обследовании они оказываются лимфогранулематозом,

лимфосаркомой, ретикулосаркомой, тератомой или тератобластомой.



Прочитать еще:

1) [Проявления в органах](#) (скарлатина)

2) [Корнеальный рефлекс](#)

3) [Вторичный туберкулез](#)