Опухоли сосудистого происхождения носят название ангиом. Они могут возникать из капилляров, артерий, вен и лимфатических сосудов. Нередко развиваются на почве пороков развития (гамартий) сосудов, таких, как телеангиэктазии и т. д.

По морфологии и течению различают несколько разновидностей ангиом как доброкачественных, так и злокачественных.

Доброкачественные опухоли

Гемангиома — общее название опухоли, развивающейся из кровеносного сосуда. В формировании опухоли принимают участие обычно все элементы стенки сосуда, но располагаются они атипично и иногда преобладают некоторые составные части стенки.

Гемангиома капиллярная построена из переплетающихся капилляров, стенки которых утолщены за счет пролиферации эндотелиальных клеток. Часть капилляров находится в спавшемся состоянии, часть заполнена кровью. Иногда опухоль не имеет четких границ и после удаления дает рецидивы. Встречается в коже и других органах как у детей, так и у взрослых. Размеры узла опухоли разные. На разрезе она имеет пестрый вид. Ангиомы кожи и **слизистых оболочек** могут изъязвляться. Гемангиома кавернозная состоит из крупных сосудистых (венозных) тонкостенных полостей, имеющих разные размеры.

Чаще всего встречается в печени, а также в коже и других органах. Имеет вид узла темно-красного цвета. Иногда кровь в полостях (пещерах) свертывается и тромбы организуются.

Прочитать еще:

1) Лимфоциты при воспалении

2) Профессиональные болезни

3) Стимуляция родовой деятельности