Фунгозный (грибовидный) рак желудка представляет собой как бы разновидность полипозной формы, но отличается более широким основанием, диаметром 6—8 см и более; поверхность его, состоящая из разного размера ворсинок, напоминает цветную капусту.

В тех. же случаях, когда поверхность опухоли более или менее гладкая, опухоль похожа на шляпку гриба. Рост экзофитный. Фунгозная форма рака желудка встречается в 10% случаев. **Гистологически** она обычно имеет строение аденокарциномы. Опухоль часто кровоточит.
Изъязвленный рак встречается крайне часто (более чем в 50% случаев заболеваемости онкологией ЖКТ). Он соединяет различные по патогенезу злокачественные изъязвления желудка, к которым причисляют первично-язвенный тип рака, блюдцеобразный рак (рак-язва) и опухоль из хронической язвы.

Первичная язвенная форма изучена еще недостаточно. Обнаруживают ее редко. Эта форма представлена экзофитным раком с изъязвлением в самом начале его развития (бляшковидный рак), образованием **острой**, а потом **хронической** раковой язвы, которую нелегко дифференцировать от язвы-рака. При микроскопическом исследовании чаще обнаруживается мелкоклеточный рак или скирр. На ранних стадиях это заболевание поддается лечению. Однако использование классических химиопрепаратов особого эффекта не дает.

Прочитать еще:

1) Комбинированные пороки сердца

2) Диффузный гломерулонефрит

3) Миелоз