

Важно отметить, что любая ретикулосаркома или ретикулосаркоматоз возникает как неблагоприятный исход лечения миелолейкоза химиопрепаратами или после применения радиорентгенотерапии.

Долгое время довольно частым клинико-морфологическим диагнозом при опухолевых разрастаниях лимфатических узлов была лимфосаркома, возникающая, по мнению Virchow, из лимфаденоидной ткани и построенная из однородного типа клеток лимфатического ряда. Лимфо-саркома возникает по аналогии с [ретикулосаркомой](#) первоначально на ограниченной территории, а затем может принять генерализованный характер. В настоящее время выяснено, что под названием «лимфосаркома» объединили по топографическому признаку ряд гистогенетически различных процессов (ретикулосаркома, лимфосаркома, лимфолейкоз).

Миеломная болезнь — системное поражение кроветворной ткани, главным образом костного мозга, сопровождающееся нарушением целостности костей.

При миеломной болезни наблюдается разрастание ретикулярных клеток, трансформирующихся в плазмобласты и зрелые плазматические клетки. Это своеобразное заболевание впервые было описано **О. А. Рустиким** (1873) и **Kahler** (1887) и поэтому носит название болезни

Рустикского — Калера

.

Written by Super Administrator

Прочитать еще:

- 2 / 2