

Увеличиваются скопления лимфатических клеток в ряде органов. Так, лимфатические клетки усиленно разрастаются в миндалинах, фолликулах зева, стенке кишечника. В результате они сдавливают соседние органы и даже свои. Это приводит к ишемии тканей.

В связи с этим при **хроническом лимфолейкозе** отмечается увеличение размерах обеих миндалин, фолликулов зева, пейеровых бляшек тонкого кишечника. При гистологическом исследовании в лимфатических узлах отмечается разрастание молодых [лимфатических клеток](#), вследствие чего рисунок строения лимфатического узла постепенно стирается. Фолликулы не различаются, нередко лимфоциты инфильтрируют трабекулы и капсулу узла. Костный мозг плоских и трубчатых костей имеет красный цвет. Однако в отличие от миелоидного лейкоза в диафизах трубчатых костей среди **красного костного мозга** встречаются участки желтого цвета. При гистологическом исследовании в ткани костного мозга обнаруживаются очаги разрастания молодых лимфатических клеток, исходящих из скоплений лимфоидных клеток или из клеток, расположенных в около-сосудистой ткани. При постепенном развитии лимфолейкоза почти вся миелоидная ткань костного мозга вытесняется лимфатической. Остаются лишь небольшие островки миелоидного кроветворения. Постепенно болезнь прогрессирует.

Прочитать еще:

Изменения в организме при лейкозе

Written by Super Administrator

Tuesday, 23 November 2010 18:34 - Last Updated Sunday, 29 July 2012 12:57

1) [Патологическая анатомия бруцеллеза](#)

2) [Проявления актиномикоза](#)

3) [Эпидемиология малярии](#)