Миокардит — воспаление сердечной мышцы, как правило, не является самостоятельным заболеванием, а обычно возникает по ходу различных болезней или осложняет их течение. Исключение составляют миокардиты с неясной этиологией, называемые аллергическими или идиопатическими.

Этиология миокардита разнообразна. Он возникает при многих заболеваниях, чаще всего инфекционных, — сыпном тифе, дифтерии, бруцеллезе, ревматизме, скарлатине, сепсисе, полиомиелите, некоторых интоксикациях (адреналин), отравлениях и т. д.

Патогенез миокардита характеризуется следующими моментами. Воспаление миокарда возникает, видимо, в результате непосредственного действия патогенного агента на мышечные волокна миокарда или на его строму, или одновременно на то и другое, вызывая альтеративные, экссудативные и пролиферативные изменения, т. е. воспаление, элементы которого могут варьировать, создавая те или иные его формы. Несомненно, что в механизме возникновения миокардита большую роль играет реактивность организма и вирулентность патогенного фактора, а также состояние интрамуральной нервной системы. Симтомы данного заболевания появляются практически сразу, где на первое место стают растройства гемодинамики. Грозным осложнением является тромбообразование.

Прочитать еще:

1) Опухоли гипофиза и эпифиза

2) Опухоли костно-суставного происхождения

3) Интрадуктальный рак