

Перикардит — воспаление наружной оболочки сердца, как висцерального ее листка, так и париетального, встречается при ряде болезней и не является самостоятельным заболеванием.

Этиология перикардита разнообразна. Причиной заболевания могут быть различные микробы (туберкулезная микобактерия, пневмококк, стрептококк, стафилококк, кишечная палочка и т. д.) при переходе на перикард воспаления, вызванного ими в соседних органах. Наблюдаются перикардиты **токсической этиологии** (например, при уремии), инфекционно-аллергической природы (при ревматизме), в результате некробиотических процессов в миокарде (инфаркт), после оперативных вмешательств на сердце (травматический перикардит), при распространении на перикард раковой опухоли (раковый перикардит) и т. д.

Патогенез

перикардита обычно несложен. Перикардит возникает при переходе [воспалительного процесса](#) с соседних органов либо контактным путем, либо по лимфатическим сосудам.

Гематогенный путь проникновения инфекции в полость перикарда признается не всеми. При повышенной чувствительности организма перикардит возникает как одно из проявлений поражения всех серозных оболочек (плевра, брюшина, синовиальные оболочки), что иногда наблюдается при ревматизме (полисерозит). Перикардит также способен привести к летальному исходу, также, как и миокардит по причине образования тромбов.

Прочитать еще:

1) [Симптомы рака легкого](#)

2) [Красный инфаркт](#)

3) [Минусы регенерации](#)