

При ревматоидном артрите процессы дезорганизации соединительной ткани и изменения сосудов наблюдаются во всех органах.

Наряду с суставными поражениями в каждом случае наблюдается и преимущественное вовлечение в патологический процесс той или иной системы, что придает клинике болезни очень пестрый и [многообразный характер](#). Это позволило различать несколько разновидностей ревматоидного артрита: преимущественно суставной, суставно-висцеральный и комбинированный (

А. И. Нестеров

).

В органах наблюдаются очаги мукоидного набухания, фибриноида, клеточные реакции, склерозы. Осложнения ревматоидного артрита различны. Одни появляются в связи с преимущественным механизмом дезорганизации соединительной ткани в суставных тканях и хряще. Сюда причисляют подвывихи и вывихи мелких суставов, ограничение движений, фиброзные и костные контрактуры, остеопороз костей.

Другие осложнения появляются на почве **обменных** и **иммунологических процессов**. К осложнениям последнего причисляют амилоидоз.

Летальный исход

при ревматоидном артрите происходит от разных причин. Болезнь может продолжаться многие годы и приводит к инвалидности, а летальный исход в таких случаях наступает от сопутствующих заболеваний: пневмонии, туберкулеза, атеросклероза. В ряде случаев больные умирают от амилоидоза.



Висцеральные проявления ревматоидного артрита

Written by Super Administrator

Wednesday, 24 November 2010 16:54 - Last Updated Monday, 30 July 2012 11:37

Прочитать еще:

- 1) [Изменения в почках при ГБ](#)

- 2) [Фазы дезорганизации соединительной ткани](#)

- 3) [Лимфоциты при воспалении](#)