

Сосуды, особенно мелкого и среднего калибра, подвержены при склеродермии разнообразным изменениям.

В то время как в одних сосудах определяются явления склероза, во многих других отмечается свежий фибриноид или, как это часто наблюдается в сосудах почек, имеется резко выраженное мукоидное набухание интимы артерий со значительным сужением просвета. **Коронарные сосуды сердца** поражаются редко. При тромбозе измененных сосудов могут возникать

[гемодинамические расстройства](#)

, приводящие, например (если это касается сосудов конечностей), к гангрене пальцев рук или ног или к возникновению очагов некроза в органах. Почки поражаются не во всех случаях склеродермии.

Иногда наблюдаются изменения сосудов почек, приводящие к незначительным **склеротическим**

и

функциональным

изменениям. Однако в других случаях поражение почек принимает угрожающий характер, и тогда говорят о «склеродермической почке». В основе патологии почек лежат сосудистые изменения, а именно

междольковых артерий

на различных уровнях вплоть до клубочковых артериол. Наблюдается концентрическое мукоидное набухание интимы междольковых артерий, фибриноидный некроз стенок, резкое сужение просвета, такие же изменения в клубочковых артериолах. Тромбоз их и капилляров клубочков. На почве этих сосудистых изменений возникают некрозы коры почек, тяжелые нарушения функции почек вплоть до их острой недостаточности.

Органы при склеродермии

Written by Super Administrator

Wednesday, 24 November 2010 17:54 - Last Updated Monday, 30 July 2012 11:23

Прочитать еще:

- 1) [Методика исследования кохлеарных и вестибулярных функций](#)

- 2) [Гипокинезия и ригидность](#)

- 3) [Особые формы проверки атаксии](#)