

Лечение сопутствующих заболеваний: ССЗ, ЕЛ, почек, печени, гипотиреоза, органов дыхания: ХОБЛ, бронхиальной астмы и др.

Вазоактивная терапия, направленная на уменьшение АМ:

пентоксифиллин, эмоксипин, агапурин, вазонит, вазопростан, танакан и др.

Медикаментозная гиполипидемическая терапия: статины — розувастатин, аторвастатин (Аторис), симвастатин (Вазилип) и др., фибраты — гемфиброзил, препараты никотиновой кислоты. Одним из мощных факторов торможения прогрессирования атеросклероза, в том числе и после операций, выполненных по поводу реваскуляризации висцеральных артерий, является коррекция дислипидемии.

В этом плане наибольшее значение имеет назначение статинов.

Антиагреганты — дипиридамол, клопидогрель (**Зилт**).

Существует мнение о значительном риске желудочно-кишечных кровотечений при назначении антиагрегантов по поводу ХАИ. Наиболее значимым предиктором риска [желудочно-кишечных кровотечений](#)

считают гастродуоденальные эрозивно-язвенные поражения, выявление которых приводит к отказу от антиагрегантной терапии. Это в полной мере обоснованно относится к ацетилсалициловой кислоте. Наиболее безопасным препаратом среди антиагрегантов является дипиридамол, который обладает модулирующим действием на тромбоцитарную агрегацию. В настоящее время, согласно международным клиническим рекомендациям, при 2 и более факторах риска желудочно-кишечных кровотечений допустимо назначение клопидогреля, при необходимости под прикрытием ингибитора протонной помпы — пантопразола.

Антиоксидантная медикаментозная терапия — мексикор, мексидол, реамберин, цитофлавин, витамины С, А, Е, альфалипоевая кислота.

Метаболическая терапия — актовегин, триметазидин (предуктал), деринат.

Терапия, направленная на улучшение функционального состояния органов брюшной полости: желудка, 12-перстной кишки, печени, поджелудочной железы — ингибиторы протонной помпы, H₂-гистаминоблокаторы, препараты висмута, прокинетики (мотилиум), гепатопротекторы (гептрал, гепатобене, урсосан, эссенциале, хофитол и др.).

Заместительная энзимотерапия: ферменты [поджелудочной железы](#) — креон, мезим форте, панкреатин, панзинорм, панцитрат и др. Системная энзимотерапия: вобэнзим, флогэнзим с целью активации и модуляции защитных реакций организма и антиагрегантного действия. Их применение значительно повышает эффективность комплексной терапии. Симптоматическая терапия — для купирования боли нитроглицерин, нитроспрей, спазмолитики, с превентивной целью — моонитраты и динитраты

Лечение осложнений: прободения, желудочно-кишечных кровотечений, стриктур и др.

Прочитать еще:

1) [Ревматические изменения](#)

2) [Формирование циркадного ритма](#)

3) [Геморрагический диатез](#)