

Патогенез острых ангины сложен. Ангина может быть первичным, самостоятельным заболеванием. Сюда относятся катаральная, фолликулярная, лакунарная, флегмонозная ангины.

Остальные формы ангины, так же как и часть перечисленных, возникают по ходу какого-либо другого заболевания и рассматриваются как местное [проявление общей реакции организма](#). В глубине крипт миндалин всегда имеются разнообразные микробы, которые при определенных условиях (ослабление организма, охлаждение, авитаминоз) начинают в порядке аутоинфекции проявлять свое патогенное действие, в результате чего развивается ангина. Известную роль в возникновении первичных ангины играет экзогенная инфекция.

Осложнения острых ангины бывают местные и общие. Местные осложнения наступают при переходе воспалительного процесса на соседние ткани, в которых развивается воспаление — серозное с отеком или гнойное. В последнем случае возникает паратонзиллярный абсцесс, флегмонозное воспаление клетчатки зева, заглоточный абсцесс (обычно наблюдаются в грудном и раннем детском возрасте), тромбоз вен. Общим осложнением является тонзиллярный сепсис. Поздними осложнениями острой ангины могут быть некоторые заболевания, носящие аутоиммунный характер. Сюда относится диффузный гломерулонефрит и ревматизм. Эти болезни возникают обычно через 3 — 4 недели, после перенесенной стрептококковой ангины; они связаны с сенсибилизацией организма. В любом случае при развитии ангины следует [вызывать врача на дом](#).

- **Хроническая ангина** (тонзиллит) возникает в результате повторных ангины и сопровождается гиперплазией лимфоидной ткани миндалин, ее склерозом и склерозом капсулы, расширением лакун, изъязвлением эпителия. В стенках сосудов отмечается склероз. При хроническом тонзиллите иногда наблюдается

начительная гиперплазия

всего лимфоидного аппарата зева и глотки, а также полости носа, что может затруднять носовое дыхание. Клиническое значение хронического тонзиллита состоит в том, что пораженные миндалины являются источником сенсibiliзирующих и инфекционно-токсических воздействий на организм и в особенности на сердце.

Как при острых, так и при хронических ангинах отмечается гиперплазия лимфатических узлов шеи.



Прочитать еще:

- 1) [Особенности продуктивного воспаления](#)

2) [Гумма при сифилисе](#)

3) [Регенерация в ЦНС](#)