

К патологии кишечника относятся пороки развития, дистрофические, воспалительные процессы, неправильности расположения, непроходимость, опухоли. **Пороком развития**

кишечника является мегасигма, которая характеризуется резким увеличением размеров сигмовидной кишки и ее брыжейки.

Просвет кишки выполнен плотными каловыми массами и зловонным газом. При гистологическом исследовании отмечается резкая гипертрофия кольцевидного мышечного слоя. Болезнь встречается преимущественно у детей. Меккелев дивертикул тощей кишки представляет собой остатки эмбриональных структур, в частности пупочно-кишечного хода.

Стенозы и атрезии могут встречаться на любом участке кишечника. Практическое значение имеют стенозы и атрезии прямой кишки и заднепроходного отверстия, возникающие в результате нарушения [эмбрионального развития](#). Дистрофические процессы в кишечнике разнообразны. Сюда можно отнести амилоидную дистрофию, кальциноз, кишечные камни (энтеролиты), отложение в слизистой оболочке некоторых пигментов (**гемоглобиногенных** и **ангемоглобиногенных**).

Воспаление кишечника занимает большое место в его патологии. Воспаление тонкой кишки носит название энтерита, который может протекать с преимущественным поражением двенадцатиперстной кишки — дуоденит, тощей кишки — еунит. подвздошной — илеит. Воспаление толстой кишки называют колитом.

Прочитать еще:

- 1) [Определенные зоны поражения](#)

- 2) [Поперечное поражение спинного мозга](#)

- 3) [Физика исследования головного мозга](#)