

Портальный цирроз печени — наиболее частая форма цирроза. Он возникает на почве белковой или липотропной недостаточности, при нарушениях пигментного обмена (гемохроматозе), обмена меди, употреблении алкоголя, после перенесенного гепатита (вирусного).

При портальном циррозе различные патогенные факторы (воспаление, жировая дистрофия, внутридольковый некроз печеночных клеток) приводят к образованию [фиброзных тяжей](#)

или септ, распространяющихся по ходу портальных трактов, вокруг и внутри долек.

Оставшиеся фрагменты долек подвергаются гиперпластическим и

регенеративным изменениям

, возникают узлы-регенераты, не достигающие, однако, таких размеров, как при

постнекротическом циррозе

. Процесс при портальном циррозе имеет диффузный и довольно однородный характер.

Макроскопически печень то уменьшена, то увеличена в размерах, поверхность ее мелкозернистая и мелкобугристая, напоминает плохую булыжную мостовую.

На разрезе поверхность печени имеет желто-бурую, иногда зеленоватую окраску, состоит из массы мелких узелков (размером не более 1 см в диаметре), разделенных друг от друга прослойками соединительной ткани.

Образование фиброзных прослоек (септ) при портальном циррозе происходит как в наружных частях долек, так и в центре их, например, вокруг жировых кист, очагов некроза, расширенных центральных вен при венозном застое.



Прочитать еще:

- 1) [Надпочечники](#)
- 2) [Опухоли периферической нервной системы](#)
- 3) [Бляшковидный рак](#)