

Все разнообразие различных вариантов цирроза печени с учетом этиологии, морфологических и терминальных проявлений приведено в других разделах. Внепеченочные изменения при циррозе печени возникают в связи с теми процессами, которые описаны в предыдущих статьях нашего сайта.

Так, на почве дистрофических изменений и нарушений тока желчи возникает желтуха. Перестройка сосудистой сети ведет к появлению портальной гипертензии, спленомегалии, асцита. Затруднение тока крови через печень приводит к развитию коллатералей венозного кровотока, компенсирующего **портальную гипертензию**. В связи со снижением

[дезинтоксикационной функции](#)

печени в кровоток попадают различные токсические вещества и это приводит к изменениям в центральной нервной системе и других органах.

Осложнения цирроза печени возникают главным образом в связи с перестройкой ее структуры. Сюда относятся асцит, осложненный перитонитом, варикозные расширения вен, кровотечения из них, недостаточность печени (гепатаргия), желтуха, явления со стороны головного мозга с развитием печеночной комы. При; длительном течении цирроза (чаще, постнекротического) может возникнуть рак печени. Все эти осложнения могут быть причиной смерти. **Компенсированный и декомпенсированный** цирроз печени в настоящее время довольно четко подразделяются, что имеет большое значение в клинике.



Прочитать еще:

- 1) [Иммунитет при ревматизме](#)
- 2) [Модификации тонометров](#)
- 3) [Роль витамина В12](#)