

В желчном пузыре наблюдаются воспалительные процессы, опухоли, образование камней.

Холецистит — воспаление желчного пузыря, имеющее разную этиологию. Наблюдаются серозные, катаральные и гнойные холециститы. Чаще всего холецистит возникает при наличии камней. Особенно опасны гнойный и гангренозный холециститы, при которых гнойный, флегмонозный, а также некротический процесс захватывает всю стенку пузыря и переходит на брюшину. Иногда возникает прободение, что ведет к гнойному перитониту.

Опухоли желчного пузыря (чаще всего рак) нередко сочетаются с наличием камней. Локализуется рак в области шейки или дна, развивается из эпителия слизистой оболочки и имеет строение аденокарциномы. Камни желчного пузыря наблюдаются при желчнокаменной болезни, которая клинически характеризуется появлением у больного приступов болей в области желчного пузыря. В ряде случаев камни в [желчном пузыре](#) не вызывают ни воспаления, ни приступов желчной колики и обнаруживаются как случайная находка при вскрытии.

Желчные камни могут быть причиной **нарушения проходимости** желчных протоков. Холециститы также возникают на почве желчных камней. Возможно прободение камнем стенки желчного пузыря или протока с выходом камня в брюшную полость и развитием перитонита.



Прочитать еще:

1) [Метастатическое обызвестление](#)

2) [Электронная микроскопия](#)

3) [Значение экссудации](#)