

Псевдоэрозия шейки матки — своеобразный патологический процесс, встречающийся у взрослых женщин и локализующийся у наружного маточного зева там, где располагаются пограничные зоны между плоским эпителием и эпителием шейки.

Псевдоэрозия, или ложная эрозия, резко выделяется своей ярко-красной окраской и неровными контурами на фоне бледной или бледно-розовой слизистой оболочки соседних участков, выстланных плоским влажным эпителием. Сама «**эрозированная**» поверхность покрыта шеечным цилиндрическим эпителием, сквозь который просвечивают капилляры подлежащей ткани и фактически никакой эрозии или дефекта эпителиального покрова здесь нет. Поверхность

[псевдоэрозии](#)

в одних случаях ворсинчатая, в других — гладкая, но под покровным эпителием разрастаются железы, напоминающие маточные. В связи с этими особенностями строения различают два вида псевдоэрозий — сосочковую и железистую.

В возникновении псевдоэрозий большое значение приписывают разрывам и рубцовым изменениям в шейке матки. В этих случаях возможны разрастания шеечного эпителия за пределы маточного зева. Такое явление носит название [эктропиона](#), т. е. выворота слизистой оболочки канала шейки за его пределы. Стимулом к разрастанию шеечного эпителия являются гормональные нарушения.

Псевдоэрозия в настоящее время считается **предраковым состоянием** в связи с тем, что эпителий, как покрывающий псевдоэрозию, так и граничащий с ним плоский, проявляет большую склонность к пролиферации. Эта пролиферация особенно резко выражена в период беременности и иногда ошибочно принимается за рак.

Помимо псевдоэрозий, в шейке матки, встречаются истинные эрозии, возникающие на почве воспаления или каких-либо других, чаще всего механических, повреждений слизистой оболочки.

Псевдоэрозия шейки матки

Written by Super Administrator

Friday, 26 November 2010 18:21 - Last Updated Thursday, 09 August 2012 14:53

Прочитать еще:

1) [Патологическая анатомия эндокардита](#)

2) [Компенсация при атеросклерозе](#)

3) [Артериальное полнокровие](#)