Патологическая анатомия цитомегалии характеризуется морфологическими изменениями, которые могут ограничиваться слюнными железами или принять распространенный характер. В первом случае говорят о локализованной, во втором — о генерализованной форме заболевания.

Локализованная форма характеризуется тем, что среди эпителиальных клеток секреторных отделов и выводных протоков слюнных желез появляются гигантские одноядерные клетки размером до 40. В крупном ядре этих клеток встречаются **ацидофильные включения**
, представляющие собой,
вероятно
, скопления
элементарных телец вируса
. В межуточной ткани слюнных желез наблюдаются воспалительные клеточные инфильтраты; процесс заканчивается развитием склеротических изменений. Генерализованная форма проявляется поражением внутренних органов, в эпителиальных выстилках которых возникают цитомегалические клетки, а в строме — воспалительные клеточные инфильтраты.

Летальность при цитомегалии достигает значительных размеров при генерализованной форме. Локализованная форма может протекать бессимптомно, но при переходе в генерализованную становится опасной для жизни. Лечение такой формы на поздних этапах практически безуспешно и требует нахождения в реанимационном отделении госпиталя.

Прочитать еще:

1) Роль минеральных нарушений

2) Злокачественные опухоли

3) Селезенка и печень при лейкозе