Салмонеллезы — инфекционные заболевания, вызываемые салмонеллами, родоначальником которых является кишечная палочка. Салмонеллезы относятся к зооантропонозам и встречаются как у человека, так и у многих животных, от которых инфекция передается человеку пищевым путем.

Наибольшее значение в патологии человека принадлежит трем типам салмонелл: S. typhi murium, S. enteritidis (Gartueri) и S. choleraesuis.

Патогенез салмонеллезов в значительной мере определяется количеством эндотоксина, освобождающегося при распаде салмонелл в кишечнике, куда они попадают вместе с испорченными пищевыми продуктами, зараженными бактериями . Обычно в клинику больные поступают с картиной пищевой токсикоинфекции. Эндотоксин вызывает картину острого гастроэнтерита, сосудистые расстройства и явления коллапса. По мнению некоторых исследователей, эндотоксин салмонелл оказывает патогенное действие на интерорецепторы желудочно-кишечного тракта и сосудов, что и вызывает рефлекторно все последующие изменения.

Патологическая анатомия салмонеллеза зависит от формы заболевания. Различают три формы салмонеллеза:

1) интестинальную (токсическую);

2) септическую;

3) брюшнотифозную.

Прочитать еще:

1) Специфическое воспаление

2) Ретикулярные клетки

3) Фагоцитоз