Стафилококки представляют собой обширную группу гноеродных микроорганизмов, разделяющихся на три вида по способности выделять пигмент:

1) золотистый (Staphylococcus aureus), **2)** белый (Staphylococcus albus) и **3)** лимоино-желтый (Staphylococcus eitreus).

Стафилококки широко распространены в природе и являются постоянными обитателями слизистых оболочек дыхательного и пищеварительного тракта, кожи, области промежности и т. д.

В последние годы интерес к стафилококкам возрос в связи со способностью их адаптироваться к антибиотикам, появлением резистентных к антибиотикам форм, их необычайной склонностью к размножению в организме в тех случаях, когда нормальная микрофлора организма подавлена антибиотиками. В этих условиях стафилококки (на фоне лечения какой-либо другой инфекции антибиотиками) могут проявить свое патогенное действие и вызвать целый ряд патологических процессов . В зарубежной печати появились даже сообщения о грозящем человечеству «стафилококковом бедствии» в связи со все более расширяющимся набором новых антибиотиков, к которым стафилококки остаются резистентными.

В настоящее время разработана классификация стафилококковых инфекций и намечены пути к их предупреждению или своевременному распознаванию.

Приводим классификацию по А. М. Харитоновой:

1. Стафилококковые поражения желудочно-кишечного тракта:
а) стафилококковые энтероколиты;
б) стафилококковые поражения желудочно-кишечного тракта у новорожденных и грудных детей;
в) стафилококковые токсикоинфекции.
2. Стафилококковые поражения дыхательных путей:

а) стафилококковые пневмонии;
б) стафилококковые тонзиллиты, фарингиты, ларинготрахеобронхиты.
3. Стафилококовая инфекция со скарлатиноподобным симнтомокомплексом.
4. Стафилококковый сепсис.
5. Стафилококковые поражения кожи.
6. Другие заболевания стафилококковой этиологии:
а) эндокардиты;
б) менингиты;
в) паротиты;
с) маститы;
д) остеомиелиты и т. д.

Прочитать еще:

1) Кратность и правила измерения АД

2) Патогенез нефритов

3) Редкие изменения при гипертонии