Туберкулез половых органов нередко сочетается с туберкулезом мочевыводящих путей. У мужчин туберкулезные очаги возникают в предстательной железе, семенных пузырьках и придатке яичка.

У женщин поражаются слизистая оболочка матки, труб и, реже, яичники. Обычно туберкулез внутренних женских половых органов сопровождается значительными спаечными процессами среди органов малого таза в связи с распространением специфического процесса на брюшину. Туберкулез серозных оболочек может возникать в результате **распространения процесса** с лимфатических узлов или в ранний период формирования первичного комплекса , или гематогенным путем. На плевре, сердечной сорочке, брюшине возникают бугорки и присоединяется серозный или серозно-фибринозный выпот. Выпот иногда подвергается некрозу с последующей организацией и отложением в некротические массы извести.

Туберкулез кожи встречается в любом возрасте и проявляется **разнообразными формами** . Фокусы туберкулезного поражения возникают в глубоких или поверхностных слоях кожи и сопровождаются изъязвлениями. Иногда туберкулезный процесс в коже сочетается со специфическим поражением лимфатических узлов. Туберкулез кожи лица называется волчанкой (**lupus vulgaris**).

Прочитать еще:

1) Морфология гастрита

2) Рубцевание и осложнения

3) Постановка диагноза ишемического поражения брюшной части аорты