

Хроническое диффузное интерстициальное воспаление происходит в печени, легких, стенке аорты, ткани яичек.

По ходу сосудов наблюдается клеточная инфильтрация, состоящая главным образом из **лимфоидных**

и

плазматических

клеток, в сосудах появляется продуктивный эндартериит и лимфангит. В последующем в пораженных местах имеет место сифилитический цирроз, что благоприятствует появлению деформации. Это особенно ярко выражено в печени, где возникает дольчатая бугристость.

Гумма — очаг сифилитического [продуктивно-деструктивного воспаления](#). Состоит из центрального очага некроза, напоминающего густой раствор гуммиарабика (отсюда название «гумма»), окруженный грануляционной тканью, находящейся в разных стадиях созревания. В грануляционной ткани можно видеть лимфоидные, плазматические, эпителиоидные клетки и гигантские клетки типа Ланганса. Обращает на себя внимание большое число мелких сосудов (артерий и вен) с явлениями продуктивного эндо- и панваскулита. Гуммы могут быть одиночными и множественными. Чаще всего они встречаются в печени, коже, мягких тканях и других органах. С течением времени некротические массы гуммы подвергаются рубцеванию, иногда обызвествляются.

Прочитать еще:

- 1) [Посмертные изменения](#)
- 2) [Фибриноидное набухание](#)
- 3) [Продуктивное воспаление](#)