

Сифилис артерий наблюдается в сосудах разного калибра. **Чаще всего** поражается аорта. Сифилитический аортит встречается в 0,5—1,5% всех вскрытий. Заболевание развивается через 15—20 лет после инфицирования и появляется обычно у граждан (чаще у мужского пола) в возрасте 40—60 лет.

Обычно патология развивается в восходящей части и дуге аорты, чаще рядом под **клапанами**

Макроскопически на интима видны белесоватые бугристости с морщинками и Рубцовыми втяжениями, придающими аорте вид шагреновой кожи. Если у больного есть атеросклероз, то картина таких проявлений несколько искажается. В типичных случаях нарушения резко прекращаются в дуге или в нисходящей части аорты. Просвет восходящей части обычно расширен (

аневризма

), а стенка аорты истончена. Брюшная аорта поражается очень редко.

При микроскопическом исследовании обнаруживается [воспалительный процесс](#), начинающийся со стороны vasa vasorum адвентиции и идущей на среднюю оболочку. Здесь можно увидеть ряды лимфоидных, плазматических клеток, фибробластов, гигантских клеток типа Лангганса, иногда мелкие очажки некроза. Этот процесс обозначается как сифилитический мезаортит. Грозными осложнениями воспалений артерий являются тромбоз, ишемия.

Прочитать еще:

- 1) [Предопухолевые изменения](#)
- 2) [Химические канцерогены](#)
- 3) [Экспериментальные данные](#) по канцерогенезу