Бластомикоз объединяет группу заболеваний кожи и внутренних органов. Единой номенклатуры возбудителей болезни и вызываемых ими страданий не существует.

Бластомицеты — дрожжеподобные грибки, отличающиеся большим разнообразием. В настоящее время выделено несколько видов бластомикоза, среди которых важное значение имеет европейский бластомикоз **Буссе — Бушке**.

Европейский бластомикоз Буссе — Бушке (син. торулез, криптококкоз) вызывается грибом Cryptococcus neoformans. Возбудитель проникает в организм аэрогенным, реже алиментарным путем
или через поврежденную кожу. Описаны случаи криптококконосительства. Болезнь встречается во всех странах, поражает человека и животных.

Различают изолированные и генерализованные формы крипкококкоза (торулеза), а также первичные, возникающие без каких-либо воздействий, и вторичные — после применения антибиотиков или кортизона.

Изолированная, локальная форма криптококкоза (торулеза) чаще всего возникает в месте входных ворот — в легких. Заболевание проявляется здесь в двух формах:

а) хроническая локализованная бронхопневмония, обозначаемая как «торулема» легкого;

б) острая бронхопневмония — проявление диссеминации гриба (генерализованная форма). Торулема макроскопически округлой или овальной формы, напоминает опухоль размером до 6 см в диаметре, на разрезе бело-желтого цвета. При микроскопическом исследовании обнаруживаются скопления лимфоидных и эпителиоидных клеток с небольшой примесью полиморфных лейкоцитов.

Прочитать еще:

1) Подъязычный нерв

2) Особые формы гиперкинезов

3) Компоненты акта мочеиспускания