

Патологическая анатомия токсоплазмоза подробно описана в последние годы. Врожденный токсоплазмоз **сопровождается** изменениями головного мозга и оболочек глаза.

Внутренние органы поражаются при генерализации инфекции. В головном мозгу и оболочках глаза возникают очаги некроза, которые быстро обызвествляются. В головном мозгу эти обызвествленные очаги имеют [желтоватую окраску](#), величину от просяного зерна до горошины и располагаются в коре больших полушарий и в **субэпендимарной зоне**

боковых желудочков мозга. Вокруг очагов в ткани мозга, а также в прилежащих к ним участках мягких мозговых оболочек и в эпендиме происходит реактивное, преимущественно продуктивного характера, воспаление. На этой почве развиваются спаечные процессы в мозговых оболочках, желудочках мозга, нарушается ликворообращение и возникает гидроцефалия.

Она постепенно нарастает, а к моменту рождения плода может достигнуть значительной степени и привести к атрофии вещества головного мозга. При микроскопическом исследовании в свежих очагах некроза находят токсоплазмозные псевдоцисты и свободно лежащие токсоплазмы. Постепенно **псевдоцисты** и массы некроза подвергаются обызвествлению. В глазу очаги некроза образуются в сетчатой оболочке и сосудистом тракте, сопровождаются продуктивным воспалением, образованием соединительной ткани и деформацией тканей глаза.

Прочитать еще:

- 1) Аспергиллез
- 2) Патологическая анатомия возвратного тифа
- 3) Трихинеллез